



Смородина — мини-брошюра

Место и посадка

- Солнце: солнечное место или лёгкая полутень (красная/белая - терпимее к тени, чёрной нужно больше солнца).
- Почва: плодородный суглинок, дренированный; pH 6.0-6.5 для чёрной, 6.5-7.0 для красной/белой.
- Схема: 1.0-1.5 м между кустами; междурядья 1.5-2.0 м. На шпалере - ряды 2.0-2.5 м.
- Посадочная яма: 40-50 см; посадка с заглублением корневой шейки на 5-7 см (особенно для чёрной) для стимулирования прикорневых побегов.

Подготовка и стартовый уход

Почвосмесь	Верхний слой + компост; хлорсодержащие удобрения не вносить под посадку.
Полив при посадке	10-15 л на куст; далее поддерживать умеренную влажность без застоя.
Мульча	Слой 5-7 см (компост/щепа) - держит влагу и чистоту ягод.
Опора (по желанию)	Шпалера/колья помогают проветриванию и облегчают сбор.

Посадка: пошагово

1. Подготовка	Смешайте верхний слой с компостом; яму пролейте.
2. Установка саженца	Посадите с наклоном 45° и заглублением шейки на 5-7 см; расправьте корни.
3. Засыпка и полив	Засыпьте, уплотните, пролейте; замульчируйте 5-7 см.
4. Первичная обрезка	Срежьте побеги на 3-4 почки для стимуляции кущения (особенно у чёрной).



Полив и питание

Полив	Равномерная влажность; особенно важен в цветение и налив ягод. Полив под корень, листья держать сухими.
Подкормки	Весной - умеренный азот; после завязи - калий/фосфор. Ежегодная мульча компостом. Без избытка азота.

Обрезка: чёрная vs красная/белая

Чёрная смородина	Плодоношение преимущественно на молодом (1-2-летнем) приросте. Ежегодно вырезайте старые ветви 4-го года у основания; держите куст из 10-15 ветвей разного возраста.
Красная/белая смородина	Плодоношение на более старой древесине и шпорцах. Не переусердствуйте с вырезкой молодого: формируйте раскидистые ветви, омолаживайте постепенно.
Санитарная	Удаляйте слабые, лежащие на земле, загущающие и больные ветви; обеспечьте проветривание.

Защита и гигиена

Болезни	Мучнистая роса, антракноз - проветривание, уборка листьев, обработки по этикетке при необходимости.
Вредители	Пилильщики, тля, почковый клещ - регулярный осмотр, санитария, при необходимости - обработка по этикетке.
Птицы	Сетка в период созревания, особенно на красной/белой смородине.

Типичные ошибки

- Посадка без заглубления шейки (особенно у чёрной) - слабое кущение.
- Густая тень и застой влаги - болезни, мелкая ягода.
- Отсутствие обновления старых ветвей - падение урожая.



Сезонный план — страница для записей

Месяц	Задачи	Подкормки / полив	Защита	Заметки
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Зима				

Подпись ответственного: _____ Дата: _____